

# Флуифорт

КАРБОЦИСТЕИНА ЛИЗИНОВАЯ СОЛЬ

## МИНИМУМ КАШЛЯ МАКСИМУМ СПОКОЙСТВИЯ



**ПРОДУКТИВНЫЙ  
КАШЕЛЬ**



Dompre



fluifort.ru

- Разжижает мокроту, не увеличивая ее объем<sup>1</sup>
- Снижает выраженность кашля<sup>2</sup>



### ГРАНУЛЫ<sup>3</sup>

**с 15 лет,**  
1 саше/  
1 раз в день



### СИРОП<sup>1</sup>

**с 2 лет,**  
2-3 раза в день согласно  
возрастным дозировкам

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Флуифорт сироп П №010489/01. 2. Yoshihisa Ishiura. Effect of carbocysteine on cough reflex to capsaicin in asthmatic patient // Br J Clin Pharmacol-2003. №55.-С.504-510. 3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Флуифорт гранулы П №010489/02

# Левопронт

леводропропизин



## Скажите СТОП сухому кашлю

**Противокашлевое средство  
периферического действия<sup>2</sup>**



Уменьшает частоту и интенсивность  
кашля с 1-ого дня<sup>1</sup>



Не угнетает дыхательный центр и не нарушает  
работу мукоцилиарного транспорта<sup>2</sup>

**Симптоматическое лечение сухого кашля<sup>3</sup>:**

- ▶ Подострый кашель<sup>3</sup>
- ▶ Трахеит<sup>3</sup>
- ▶ При ОРВИ и гриппе<sup>3</sup>
- ▶ COVID 19<sup>4</sup>

**Для взрослых  
и детей  
с 2 лет<sup>2</sup>**



**Левопронт  
сироп, 120 мл**

**ДОЗИРОВКА<sup>2</sup>:**

**Дети 10-20 кг:**  
по 3 мл до 3 раз в день

**Дети 20-30 кг:**  
по 5 мл до 3 раз в день

**Взрослые и дети более 30 кг:**  
по 10 мл до 3 раз в день

1. Giuseppe Gunella, et al. Efficacy and safety of use of levodropropizine in patients with chronic interstitial lung disease Clin Ther. 1991; 136:261-266.

2. Инструкция по медицинскому применению Левопронт, ЛП-005912 от 14.11.2019

3. А.Б. Малахов, Н.Г. Колосова, И.В. Гребенева Кашель у детей: тактика педиатра в отношении диагностики и лечения. Практическая пульмонология 2021 N03.

4. Временные методические рекомендации N017 от 14.12.2022



[www.levopront.ru](http://www.levopront.ru)